

25 01 2025

MAMMOGRAPHIE PLEIN CHAMP DES DEUX SEINS (VUES CC ET MLO)

Sein droit :

- La peau et la graisse sous-cutanée semblent normales.
- Le parenchyme mammaire est de nature principalement dense ... ACR d.
- Le quadrant supérieur externe droit révélant une zone focale de distorsion architecturale est visible ... BIRADS 4 ... Pour la corrélation échographie/IRM.
- Peu de ganglions axillaires hypertrophiés sont visibles.
- L'espace rétro-mammaire visualisé semble normal.

Sein gauche

- La peau et la graisse sous-cutanée semblent normales.
- Le parenchyme mammaire est de nature principalement dense ... ACR d.
- Une densité centrale mal définie est visible, montrant des contours mal définis ... BIRADS 0 ... Pour corrélation échographique.
- Aucun ganglion axillaire suspect n'est visible.
- L'espace rétro-mammaire visualisé semble normal.

Impression :

- Le quadrant supérieur externe droit révélant une zone focale de distorsion architecturale est visible ... BIRADS 4 ... Pour la corrélation échographie/IRM.
- Une densité mal définie est visible dans la région centrale gauche du sein, montrant des contours mal définis ... BIRADS 0 ... Pour la corrélation échographique.

Dr Hoda Abdelhamid

Médecin-Spécialiste-Radiologie diagnostique-DHA-P-48464879

ZIA MEDICALCENTER LLC-DUBAI

Veuillez noter que la précision diagnostique des rapports de mammographie est augmentée lorsqu'ils sont interprétés en comparaison avec des images antérieures (pas seulement le

rapport). Il est recommandé d'apporter toutes les études antérieures effectuées au moment de votre rendez-vous de mammographie.