

COMPLEXE MEDICAL DE LA CORNICHE OUEST

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

Corniche Ouest, Rue Léo Frobenius prolongée

BP 5027 Dakar -Fann

Tél : 33 824 99 29 / Fax : 33 859 12 60 E-mail : contact.cmcod@gmail.com

Dakar, 17 novembre 2025

N°Dossier :	33706	Nom et prénom :	TABI TAKANG TABE
DDN :	08/03/1981	Sexe :	Homme
Date du prélèvement :	15/11/25 08:48	Age :	44 ans
Nature du prélèvement	SANG	Prescripteur :	DR CORREA PATRICK

HEMATOLOGIE

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
<u>Vitesse de sédimentation</u>			
VS 1ère heure	* 32 mm/h	< 15	13 (10/11/2025)

BIOCHIMIE

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
Créatininémie	12.6 mg/l	7 - 13	11.2 (10/11/2025)
Glycémie	* 1.55 g/l	0.7 - 1.1	1.20 (10/11/2025)
Hémoglobine glycosylée A1C(HbA1C)	* 7.9 %	4 - 6	-

HORMONOLOGIE

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
VITAMINE D	25.40 ng/ml		-

Déficient : < 20 ng/mL
Insuffisant : 20-29 ng/mL
Suffisant : 30-100 ng/mL
Toxicité potentielle : > 100 ng/mL

SEROLOGIE

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
<u>Proteine C Réactive</u>			
Proteine C Réactive	* 48 mg/l	< 6	-
Antigene HBS	Négatif		-



Dakar, le 15/11/2025

Cher Confrère,

Je vous remercie de m'avoir adressé votre patient(e) : **TABI TAKANG TABE**

Age : **44 ans**

Sexe : **M**

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : Cytolyse hépatique.

RESULTATS :

Le foie est non dysmorphique, de taille normale (FH à 179 mm) de contours réguliers. Son échostructure est modérément hyperéchogène homogène, n'effaçant pas la paroi des veines portes. Pas de lésion focale.

Le tronc porte est perméable, de calibre normal (13 mm) avec un flux hépatopète et des vitesses mesurées à 20 cm/s.

La vésicule biliaire est non distendue, de contenu anéchogène et à paroi fine.

Pas de dilatation des voies biliaires intra et extra-hépatiques.

La rate est de taille normale (132 mm) et d'échostructure homogène.

Le pancréas est d'aspect morphologique normal.

Les reins sont en situation modale, de taille normale, de contours réguliers, d'épaisseur corticale conservée. Ils présentent une bonne différenciation cortico-sinusale, sans dilatation des cavités pyélocalicielles.

Pas d'épanchement intra-péritonéal ni d'adénopathie intra-abdominale.

Vessie en bonne réplétion, paroi fine et contenu anéchogène.

CONCLUSION :

Stéatose hépatique modérée.

Foie non dysmorphique, aux contours réguliers, sans lésion focale décelable.

Absence de signes d'hypertension portale.

Dr Y. KASSE

IMAGERIE MODERNE DU SENEGAL
I.MOD.SEN SARL
Tel : +221 33 859 12 59 / Fax : +221 33 859 12 60
BP : 5027 DAKAR FANN